

**FASE LOCAL DE LA XLIV OME**  
SESIONES PRIMERA Y SEGUNDA  
18 y 19 DE ENERO DE 2008 (TARDE Y MAÑANA)

1. Demuestra que no existen enteros  $a, b, c, d$  tales que el polinomio  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ) cumpla que  $P(4) = 1$  y  $P(7) = 2$ .

SOLUCIÓN:

Supongamos que tal polinomio existe.

Por el teorema del resto  $P(x) = (x-4)Q(x) + 1$ , siendo  $Q(x)$  un polinomio de grado dos con coeficientes enteros.

Entonces  $P(7) = 2 = (7-4)Q(7) + 1 \Rightarrow Q(7) = \frac{1}{3}$  que no es entero, en contra de la hipótesis.

2. En el triángulo  $ABC$ , el área  $S$  y el ángulo  $C$  son conocidos. Hallar el valor de los lados  $a$  y  $b$  para que el lado  $c$  sea lo más corto posible.

SOLUCIÓN:

Por una parte

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = (a-b)^2 + 2ab(1 - \cos C) \quad \text{y por otra}$$

$$S = \frac{1}{2} ab \operatorname{sen} C \Rightarrow ab = \frac{2S}{\operatorname{sen} C}. \quad \text{Entonces,}$$

$$c^2 = (a-b)^2 + \frac{4S(1 - \cos C)}{\operatorname{sen} C} \quad \text{será mínimo cuando } a = b = \sqrt{\frac{2S}{\operatorname{sen} C}}.$$

3. Determina todas las ternas de números reales  $(a, b, c)$ , que satisfacen el sistema de

$$\text{ecuaciones siguiente: } \begin{cases} a^5 = 5b^3 - 4c \\ b^5 = 5c^3 - 4a \\ c^5 = 5a^3 - 4b \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que  $a = \max\{a, b, c\}$ .

Primer caso:  $c \geq b$ . Entonces  $a^5 + 4c \geq c^5 + 4b$  y  $b \geq a$ . De este modo  $a = b = c$ .

Segundo caso:  $b \geq c$ . Entonces  $b^5 + 4a \geq c^5 + 4b$  y  $c \geq a$ . Por tanto  $a = b = c$ .

Así todo se reduce a resolver la ecuación  $t^5 - 5t^3 + 4t = 0$ , donde  $t = a = b = c$ .

Claramente  $t \in \{0, 1, -1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$  y hay cinco posibles ternas que cumplen el sistema dado.

4. ¿Qué número es mayor  $999!$  ó  $500^{999}$ ? Justifica la respuesta.

SOLUCIÓN:

Pongamos  $A = 999!$ ,  $B = 500^{999}$ , tenemos

$$\frac{A}{B} = \frac{500-499}{500} \cdot \frac{500-498}{500} \cdots \frac{500-1}{500} \cdot \frac{500}{500} \cdot \frac{500+1}{500} \cdots \frac{500+498}{500} \cdot \frac{500+499}{500} =$$

$$\left(1 - \frac{499}{500}\right) \left(1 - \frac{498}{500}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{500}\right) \left(1 + \frac{1}{500}\right) \cdots \left(1 + \frac{498}{500}\right) \left(1 + \frac{499}{500}\right) =$$

$$\left[1 - \left(\frac{499}{500}\right)^2\right] \left[1 - \left(\frac{498}{500}\right)^2\right] \cdots \left[1 - \left(\frac{2}{500}\right)^2\right] \left[1 - \left(\frac{1}{500}\right)^2\right] < 1.$$

Por tanto  $A < B$ .

5. Sean  $D, E, F$  los puntos de tangencia del círculo inscrito al triángulo  $ABC$  con los lados  $BC, AC$  y  $AB$  respectivamente. Demuestra que

$$4S_{DEF} \leq S_{ABC}$$

donde  $S_{XYZ}$  denota el área del triángulo  $XYZ$ .

SOLUCIÓN:

Sea  $I$  el incentro del triángulo  $ABC$ . Tenemos que  $ID \perp BC, IE \perp AC$  e  $IF \perp AB$ .

Por otro lado, utilizando las notaciones usuales,

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sen A = \frac{1}{2} bc \sen A \quad \text{y} \quad S_{EFI} = \frac{1}{2} EI \cdot FI \sen EIF = \frac{1}{2} r^2 \sen EIF.$$

Como los ángulos  $A$  y  $EIF$  son suplementarios, entonces  $\sen A = \sen EIF$  y

$$\frac{S_{EIF}}{S_{ABC}} = \frac{r^2}{bc}. \quad \text{Análogamente} \quad \frac{S_{EID}}{S_{ABC}} = \frac{r^2}{ab} \quad \text{y} \quad \frac{S_{FID}}{S_{ABC}} = \frac{r^2}{ca}.$$

Sumando estas tres fracciones resulta:

$$\frac{S_{DEF}}{S_{ABC}} = \frac{S_{EIF} + S_{EID} + S_{FID}}{S_{ABC}} = \frac{r^2(a+b+c)}{abc}.$$

Como  $S_{ABC} = r \left( \frac{a+b+c}{2} \right)$  y  $4RS_{ABC} = abc$ , se obtiene  $\frac{r^2(a+b+c)}{abc} = \frac{r}{2R}$ .

Aplicando ahora la desigualdad de Euler  $R \geq 2r$ , se obtiene  $\frac{S_{DEF}}{S_{ABC}} = \frac{r}{2R} \leq \frac{1}{4}$  y la

igualdad se cumple cuando el triángulo  $ABC$  es equilátero.

6. Las longitudes de los lados y de las diagonales de un cuadrilátero convexo plano  $ABCD$  son racionales. Si las diagonales  $AC$  y  $BD$  se cortan en el punto  $O$ , demuestra que la longitud  $OA$  es también racional.

SOLUCIÓN:

Sean  $\angle ABD = \alpha$ ,  $\angle CBD = \gamma$  y  $\angle CBA = \beta$ .

Por el teorema del coseno en el triángulo  $\triangle ABC$ ,  $\cos \beta = \frac{AB^2 + BC^2 - CA^2}{2AB \cdot BC}$  es un número racional. Análogamente  $\cos \alpha$  y  $\cos \gamma$  son números racionales.

Por otra parte,  $\cos \beta = \cos(\alpha + \gamma) = \cos \alpha \cos \gamma - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \gamma$ . Y así  $\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \gamma$  es un número racional. También es racional  $\operatorname{sen}^2 \gamma = 1 - \cos^2 \gamma$ . Por tanto  $\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{sen} \gamma} = \frac{\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \gamma}{\operatorname{sen}^2 \gamma}$

es racional.

Aplicando el teorema de los senos a los triángulos  $\triangle OAB$  y  $\triangle OCB$  respectivamente se tiene que  $\frac{AB}{\operatorname{sen} \angle BOA} = \frac{AO}{\operatorname{sen} \alpha}$  y  $\frac{BC}{\operatorname{sen} \angle BOC} = \frac{OC}{\operatorname{sen} \gamma}$ . Se deduce que

$\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{BC} \cdot \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{sen} \gamma} = r$ , es un número racional. Entonces  $AC = OA + OC = (1 + r)OA$ .

Por tanto  $OA = \frac{AC}{1 + r}$  es racional.